

Afrikansk Stuelind

(*Sparmannia africana*)

Værd at vide:

Stuelinden er en træagtig busk med hjerteformede bløde blade og meget bløde grene. For enden af grenene udvikler blomsterskærmene sig fra vinter til foråret og det med hver ca. 20 hvide blomster.

I det 19. århundrede blev den taget i kultur af Royal Botanic Garden i London.

Oprindelse:

Hjemmehørende i Sydafrika i det skovrige område i Cape Province i Port Elizabeth.

Formering:

Såning og spring er muligt hele året indendørs. Strø de ca. 3 mm små frø jævntfordelt ud på fugtig såjord og dæk dem kun med et ganske tyndt lag af såjorden. Såjorden holdes jævnt fugtig og ved en temperatur på 20° til 25° C. Spiringen følger allerede efter 14 til 20 dage. 2 til 3 måneder efter spring kan frøplanterne prikles (omplantes til små potter).

Placering / lys:

Stuelinden elsker lyse placeringer, men beskyttes mod direkte brændende sol. Om sommeren kan den også stå i det fri, gerne på en vindbeskyttet plads.

Gødning, vanding og pleje:

Humus rig og godt drænende jord er det ideelle vækstmedie. Om sommeren vandes meget og den skal have en fugtig rodklump hele tiden. Gødes ugentligt fra marts til september med krukkeplantegødning. Grundet den hurtige vækst kan den skæres tilbage til den ønskede form.

Overvintring:

En lys overvintring ved 10° C er optimal (f.eks. trappeopgang eller vinterhave). Vand sparsomt, da for meget vand om vinteren fører til rådne stængler. Ved for tør luft kan enkelte hvide fluer vise sig. Allerede i januar begynder Stuelinden dens nye vækstsæson. Ved en temperatur på under 10° C smider den sine blade - i det tilfælde skal den holdes meget tør. Stuelinden er meget ømtålig overfor frost.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

