

Rød Passionsblomst

(*Passiflora coccinea*)

8 frø

Værd at vide:

Den Røde Passionsblomst skiller sig ud med sin robusthed. Den er stedsegrøn og kan udvikle op til 3,5 meter lange træagtige stængler.

Om sommeren og efteråret viser de store, lysende og skarlagensrøde blomster sig med deres hvide og rosafarvede krone.

Oprindelse:

Den Røde Passionsblomst er hjemmehørende i Sydamerika.

Formering:

Såning/spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad frøene ligge i blød i nogle timer i rumvarmt vand. Herefter fordeles frøene på fugtig såjord og dækkes med et tyndt lag såjord. Ved jævn fugtighed og en spiringstemperatur på 20° til 25° C spirer frøene efter 2 til 4 uger.

Placering / lys:

Lyse til solrige placeringer er ideelle. Jo mere sol planten får jo flere blomster udvikler den. En placering i det fri er muligt fra sidst maj til start oktober.

Gødning, vanding og pleje:

Vand gennem vækstsæsonen rigeligt, men undgå vedvarende våd jord. Godt drænende enhedsjord er tilstrækkelig. Der skal etableres et espalier allerede til de unge planter. Planten skal fra april til oktober ugenligt tilføres krukkeplantegødning. Ved for tør rodklump eller næringsstofmangel udvikles der hurtigt gule blade.

Overvintring:

Fra midt oktober skal der vandes mindre og er planten ikke skåret tilbage skal der gives lidt gødning hver 4. uge. Planten skal stå lyst og køligt ved en temperatur på 5° til 10° C vinteren over. Ved en varmere overvintring skal bladene overbruses med en forstøver (brug kalkfrit vand). Må ikke stilles i nærheden af en radiator.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

