

## Hængende Snabel Helikon

(*Heliconia rostrata*)

### Værd at vide:

Denne skønne eksotiske plante tilhørende bananvæksternes familie er vel den mest slående *Heliconia* art. Den har en stor hængende kaskade af skarlagensrøde tragtblomster, hvori der sidder en gul-grøn "snabel-blomst". I modsætning til de fleste *Heliconia* arter hænger blomsterne på denne art nedad. I England bliver den på grund af sine blomster også kaldt "Hængende-Hummerklo". Der findes ca. 100 stedsegrønne arter, hvis blade minder om bananer eller *Strelitzia* og som når en højde på 1 til 3 meter.

### Oprindelse:

Hjemmehørende i sydamerika overvejende Peru og Argentina.

### Formering:

Såning/spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene spirer kun ved en temperatur på mellem 22° og 28° C og i en periode på 3 til 8 uger. Tryk frøene ned i dybde af 1 cm i fugtig såjord og stil såbakken mørkt og varmt. Vær opmærksom på at der holdes en jævn fugtighed og udluft hver 2. til 3. dag.

### Placering / lys:

Som tropisk plante trives denne *Heliconia* bedst ved en temperatur på minimum 18° C eller derover og på en halvskygget plads. Ideelt er det med en placering i et væksthuse eller en vinterhave.

### Gødning, vanding og pleje:

For en sund vækst skal planten 4 til 6 uger efter spiring omplantes i humusrig og godt drænende jord. For at fremme udviklingen af nye skud bør afgroede blade fjernes ved afklipping. Gennem vækstsæsonen skal der vandes godt og planten bør overbruses med kalkfrit vand. Gød hver 4. uge med krukkeplantegødning.

### Overvintring:

Temperaturen på vinteropbevaringsstedet må ikke ligge på under 15° C da denne *Heliconia* er meget kuldefølsom. Overbrus planten regelmæssigt da der ved for tør luft er fare for angreb af spindemider og skjoldlus.

### Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

