

Australsk Kænguruvin

(*Cissus antarctica*)

20 frø

Værd at vide:

Den rankedannende klatreplante vokser i naturen højt op i kronerne på regnskovens træer og herfra hænger de ned som lianer. I stuen vokser den problemløst i pletter og er fuldstændig fordringsløs.

Kænguruvinen regnes til familien af Vine, som tæller ca. 350 arter. Planten blev oprindeligt kultiveret på grund af dens dekorative blade. Disse er lysende grønne, spidst tilløbende og har savtakkede bladkanter. Blomsterne er mest gule og små. Fra blomsterne udvikler der sig kødrige frugter, der minder om vindruer, men som dog er uspiselige.

Oprindelse:

Kænguruvinen er hjemmehørende i de fugtige skove i det østlige Australien.

Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Slib de ret hårde frø med sandpapir eller læg dem i blød i rumvarmt vand i 24 timer. Dernæst sættes fordeles de ud på fugtig såjord, hvor de sættes i en dybde af 1 cm. Ved jævn fugtighed og en temperatur på ca. 24° C spirer frøene efter 2 til 4 uger.

Placering / lys:

Kænguruvin er en stueplante, der ikke bryder sig om direkte sol. Ideelt er det med en halvskygget til skygget placering.

Gødning, vanding og pleje:

Planten trives i enhedsjord og kræver som klatreplante et espalier. Den tåler problemløst store temperaturforskelle og føler sig tilpas i såvel opvarmede som uopvarmede rum. Der vandes lidt men regelmæssigt. *Cissus* 'en tåler ikke vedvarende våd jord og får ved for meget vand gule blade eller minimum store gule pletter på bladene. Fra maj til september tildeles den gødning hver uge.

Overvintring:

Cissus antarctica er ikke vinterhårdfør. Temperaturen må ikke ligge under 5° C. Vanding foretages som på det øvrige årstider.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

