

Engletrompet (pink)

(*Brugmansia suaveolens* "pink")

12 frø

Advarsel: Plante og frø er giftige! Lad ikke børn komme i nærheden.

Værd at vide:

Engletrompeten med dens kæmpe, 30 cm lange pinkfarvede blomster tilhører den stærkt voksende art, der allerede tidligt forgrener sig og kan blive op til 3,5 meter høj. Denne *Brugmansia* blomstere af flere omgange meget kraftigt - mange gange 2 til 4 uger og så igen i 3 til 7 uger. Der er næsten altid blomster at se.

Oprindelse:

Dens oprindelige hjemsted er Sydbrasilien. I finder man planten mange steder i Sydamerika, Caribien og tropisk Afrika.

Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt i perioden fra februar til september. Læg frøene i blød i rumvarmt vand i 12 timer og efterfølgende sættes de i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Ved en temperatur på ca. 20° C følger spiringen efter 2 til 4 uger.

Placering / lys:

Ideelt er det for planten med en lys og solrig placering, der dog skal beskyttes mod middagssolen. Planten placeres hellere vindbeskyttet end i det fri, da de mange og store blade samt blomster giver en stor "angrebsflade" for vinden.

Gødning, vanding og pleje:

Om sommeren vandes rigeligt - bedst morgen eller aften. Rodklumpen skal være rigtig gennemvåd. I modsat fald får planten hurtigt hængende og sovende blade. Fra maj til oktober skal den hver uge tilføres krukkeplantegødning. Dens næringsstofbehov er meget højt. Vælg også gerne en stor krukke eller potte med et stort volumen til planten.

Overvintring:

Fra efteråret vandes mindre og planten overvintres ved 4° til 10° C. Ideelt er det med et rum med godt luftskifte - i nødstilfælde også mørkt. Udtynd dens grene og studs generelt planten om vinteren eller om foråret. En total tilbageskæring er også en mulighed. Ompot planten hvert forår.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

