

Sød Passionsblomst

(*Passiflora ligularis*)

20 frø

Værd at vide:

Sød Passionsblomst giver de sødeste og lækreste af alle passionsfrugter. Den skønne ranke- og klatreplante fra Sydamerika vokser der fra 900 til 2.600 meters højde. Dens ranker vokser stærkt op til 6 til 10 meter. I modsætning til mange andre *Passiflora* arter udvikler den helrandede ikke foldede blade, der bliver meget store, op til 15 til 20 cm.

Oprindelse:

Sydamerika.

Formering:

Såning/spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Læg frøene i blød i nogle timer i rumvarmt vand. Herefter fordeles frøene på fugtig såjord og dækkes med et tyndt lag såjord. Ved en jævn fugtighed og en temperatur på 20° til 25° C spirer frøene efter 2 til 4 uger.

Placering / lys:

Lys til solrig placering er ideelt. Jo mere sol planten får jo flere blomster udvikler den. En placering i det fri er muligt fra maj til oktober.

Gødning, vanding og pleje:

Vand rigeligt i vækstperioden, men undgå vedvarende våd jord. Godt drænende enhedsjord er tilstrækkeligt som voksemedie. Sørg allerede fra ungplante stadiet for et espalier. Planten skal fra april til oktober ugentligt tilføres krukkeplantegødning. Ved for tør jord eller næringsstofmangel udvikler der sig hurtigt gule blade.

Overvintring:

Fra midt oktober skal der vandes mindre. I det tilfælde planten ikke er skåret tilbage, skal der gødes lidt hver 4. uge. Passionsblomsten skal overvintres lyst og køligt ved en temperatur på 5° til 10° C. Overbrus bladene hyppigere ved en varmere vinteropbevaring. Stil aldrig planten i nærheden af en varm radiator.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

