

Kyst Hibiscus

(*Hibiscus tiliaceus*)

15 frø

Værd at vide:

Kyst Hibiscus, også kaldet Lindebladet Hibiscus, vokser til en stor busk henholdsvis et lille træ. Bladene er runde til hjerteformede og viser sig med en mørkegrøn overside. Iøjenfaldende er de indtil 12 cm store blomster. De åbner sig om morgenen med en lysende gul farve, der langsomt går over i en orange farve og bliver om aftenen næsten mørkebrune.

Den pasningslette plante er hjemmehørende i mange tropiske og subtropiske kystområder. Da frøene kan "svømme" / flyde ovenpå har planten bredt sig vidt omkring. På engelsk hedder planten Coast Hibiscus eller også Wild Cotton Tree (Vildt Bomuldstræ).

Fra dens fiberrige bark kan der fremstilles reb og i Stillehavsområdet fremstilles der også skørter. På vores breddegrader lader Kyst Hibiscussen sig nemmest dyrke i pletter eller krukker.

Oprindelse:

Hjemegnen for Kyst Hibiscus strækker sig over mange tropiske og subtropiske kystregioner fra Australien, Indien, Mellem- og Sydamerika såvel som Sydeuropa.

Formering:

For en hurtigere spiring skal frøene overhældes med varmt vand og lægges i blød i rumvarmt vand natten over. Efterfølgende fordeles de små frø ud på fugtig såjord og dækkes af et tyndt lag heraf. Iblanding af ca. 1/4 sand eller perlite i såjorden vil være ideelt. Ved 20° til 25° C spirer frøene efter 2 til 5 uger. I denne periode må der ikke overvandes.

Placering / lys:

Da unge planter kan blomstre stærkt er en lys og solrig placering nødvendig. Fra maj kan Kyst Hibiscus i plette eller krukke stilles i det fri.

Gødning, vanding og pleje:

Planten vokser kraftigt og behøver for blomstringen en regelmæssig vanding, da bladene er ret store. Ved vandmangel reagerer Hibiscus ved at smide bladene. Indtil efteråret skal den tildeles krukkeplantegødning regelmæssigt hver 2. uge. På grund af dens kraftige vækst og rodudvikling vil en omplantning om foråret hvert år til hvert 2. år være påkrævet.

Overvintring:

Den placeres lyst vinteren over ved en temperatur på 10° til 15° C. Selv om den smider bladene skal den fortsat vandes, dog væsentligt mindre. I februar / marts bør planten skæres tilbage. Derved kan den bedre forgrene sig og der vil ikke udvikles "kolde" kviste foruden.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

