

Bonsai - Kamelia

(Camelie japonica) (indendørs bonsai)

4 frø

Ved formering af bonsai ligger den store chance deri, at man fra starten kan påvirke form og facon på træet. Det varer ganske vist længere at få et træ, når man starter med et frø. Til gengæld får man et tættere træ, når man lader det vokse til i en bonsaiskål end, hvis man tog træet i en skov.

Værd at vide:

Camelie eller Tebusk er en gammel kendt kulturplante fra Sydøstasien.

Oprindelse:

Camelie japonica har sin oprindelse i Sydøstasien.

Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad frøene ligge i blød i ca. 12 timer i rumvarmt vand. Dernæst sættes frøene i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Ved en temperatur på 22° til 25° C spirer frøene efter 3 til 7 uger.

Placering / lys:

Den kan placeres halvskygget til solrigt. Fra maj til oktober kan den også placeres i det fri på en vindbeskyttet plads.

Gødning og vanding:

Vand regelmæssigt med kalkfattigt vand (bedst med regnvand), men undgå vedvarende våd jord. Ideelt er det også med en overbrusning med en forstøver (anvend også her kalkfrit vand). Fra april til september gødes den hver 3. uge.

Beskæring:

Bonsai der skal udvikle blomster til om sommeren må kun beskæres lige efter de første skud ellers lader man den udvikle ca. 6 nye blade og så beskære disse skud tilbage til 2 til 3 blade.

Jord:

Anvend humusrig, sandholdig jord. Velegnet er også færdig Rhododendronjord. Blander man selv jorden, bør der anvendes 1/4 del enhedsjord, 2/4 sphagnum og 1/4 sand.

